

1885

Lane Medical Library

s der Königl. Universitäts-Frauenklinik zu Breslau:
Zwölf Fälle von Neubildungen der Vulva.

Inaugural-Dissertation,

welche nebst beigefügten Thesen mit Genehmigung der

medizinischen Facultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

Freitag, den 31. Juli Nachmittags 4 Uhr

in der Aula Leopoldina


öffentlich verteidigen wird

Paul Mertz.

Opponenten:

Dr. med. **R. Croce**, Volontärarzt am Hospital zu Allerheiligen.

Drd. med. **Karl Becker.**



Breslau,

Druck von Robert Nischkowsky.

1885.

einem hochverehrten Lehrer

Herrn Medicinalrat Professor

Dr. Heinrich Fritsch,

Director der Königl. Universitäts-Frauenklinik zu Breslau,

in Hochachtung und Dankbarkeit

sowie

einen lieben guten Eltern

in kindlicher Liebe und Ehrfurcht

gewidmet

vom

Verfasser.

Der Beginn meiner Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht,
dem Medicinalrat Prof. Dr. H. Fritsch für die Anregung zu
selben, für die gütige Überlassung der klinischen Fälle, sowie
die freundliche Unterstützung bei Anfertigung dieser Arbeit
meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Die Geschwülste der Vulva gehören im allgemeinen zu den selteneren Krankheiten. Wenn dieselben auch früher schon bekannt und beobachtet worden sind, so konnten doch erst durch die erhöhte Ausbildung der Gynaecologie, besonders durch die vervollkommnung der gynaecologischen Operationstechnik in der neueren Zeit die Diagnostik und Behandlung der Neubildungen eine genauere Praecision erfahren. Seitdem hat sich natürlich die Zahl der zur Beobachtung kommenden Fälle von mehr oder minder selteneren Tumoren der Vulva sehr gesteigert. So wurden allein in der hiesigen gynaecologischen Klinik in den Jahren 1882—1885 12 diesbezügliche Fälle behandelt.

Diese 12 Fälle sind mir durch die Güte des Herrn Medizinalrath Professor Dr. Fritsch zur Publikation übergeben worden.

Ehe ich jedoch dazu übergehe dieselben zu veröffentlichen, will ich vorher zur besseren Übersicht eine Zusammenstellung und kurze Schilderung derjenigen Geschwülste geben, welche bis jetzt — nach der mir zugänglichen Litteratur — überhaupt an der Vulva beobachtet und beschrieben worden sind.

Ich beginne mit denjenigen Geschwulstformen, welche zu den häufiger vorkommenden Vulvaerkrankungen zu rechnen sind. Zunächst die *Elephantiasis vulvae*. Unter der *Elephantiasis vulvae* verstehen wir eine auf die äusseren weiblichen Genitalien sich erstreckende Krankheit, die in einer Hyperplasie des subcutanen Bindegewebes und der äusseren Haut besteht und bei weiterer Entwicklung zu einer Massenzunahme aller örtlich mit erkrankten Gewebe führt. Dass grade hier die elephantiasische Wucherung häufig vorkommt, darf uns nicht Wunder nehmen, weil in dem am meisten entwickelten Blut- und Lymphgefässsystem der äusseren

Genitalien es sehr leicht einerseits zu Gefässdilatationen, anderseits zu Retentionen der Gewebssäfte kommen kann. Gerade dem letzten Momente sehen viele Autoren, wie Klebs¹⁾, Virchow²⁾, den Haupteinfluss für die Entstehung von Hyperplasie der Gewebe der *Vulva*.

Was die besondere Form anlangt, die hier die *Elephantiasis* bildet, so unterscheidet Klebs in seinem oben citierten Handbuch der path. Anatomie drei besondere Formen, nämlich 1) eine epidermoidale Form, bei der die Gebilde der Epidermis, nämlich die Papillen sich beteiligen, 2) eine bindegewebige Form, die vornehmlich eine stärkere Entwicklung der zelligen Elemente des Bindegewebes und Anhäufung von Schleim in den Maschen zeigt, und 3) eine lymphangiomatöse Form. Hier sind die lymphatischen Apparate erkrankt, indem die Gefässwände eine stark hyperplastisch entwickelte Muscularis haben, ihre Anfänge in den Papillen ampullär erweitert sind und kleine Bläschen bilden.

Wir kommen jetzt auf den Sitz der in Rede stehenden Affecte zu sprechen. Da müssen wir nun sagen, dass nach statistischen Angaben hierüber³⁾ mit Vorliebe die Wucherung einerseits an den grossen Labien andererseits an der Clitoris sich vorfindet. In unserem vorliegenden Falle war es die rechte grosse Schamlippe, die von der elephantiasischen Wucherung befallen wurde.

Als aetiologische Momente werden genannt: Lues, Masturbation, Onanie, überhaupt geschlechtliche Ausschweifungen jeglicher Art.

Von dieser auch in den gemässigten Zonen nicht zu den Seltenheiten gehörenden Krankheit kam in der gynaecc. Klinik ein solcher Fall zur Beobachtung.

I. Auguste B., 26½ Jahr. 8. Sept. 1884 — 20. Sept. 1885.

Seit 2 Jahren verheiratet. Einmal entbunden, spontan, Wochenbett gesund, 14 Tage gelegen, kein Fieber. Menstruation zuerst mit 15 Jahren, stets regelmässig alle vier Wochen, schwach 2—3 Tage lang, ohne Schmerzen, die letzte vor 14 Tagen.

Jetzige Krankheit. Seit ihrer frühesten Jugend hat Patientin einen Tumor an der rechten grossen Schamlippe, in der letzten Schwangerschaft bedeutend zugenommen hat.

1) Klebs, Handbuch der path. Anatomie. Berlin 1876. I. Band.

2) R. Virchow, Geschwülste I. S. 320.

3) Fritz Fisch, Inaug. Dissert. Bonn 1885.

geschwülste verursachten zu manchen Zeiten Schmerzen, Patientin hat dabei das Gefühl von Stechen. Beim Arbeiten keineörung.

Objekt. Befund. Mittलगrosse kräftige gesunde Person; dem rechten Lab. majus eine Geschwulst von Faustgrösse, Konsistenz ziemlich weich. Die Haut ist dunkel gefärbt, zahlreiche dilatierte Venen sind zu sehen. An der Basis des Tumors fühlt man einen Strang, der nach oben nach dem Leistenkanal zieht. Der Tumor ist breit basisch inseriert.

Uterushöhle 6 cm lang. Introitus vaginae ziemlich eng. Scheide glatt, kurz, mässig weit. Portio kurz, etwas nach L. geteilt. Uterus etwas dextrovertiert. Klein, schmerzlos.

Diagnose: *Tumor lab. ma. dextr. (Elephantiasis)*.

Therapie. Vorbereitet mit Sitzbädern und Abführmitteln.

Operation 10. Sept. 1884. Der breite Stiel des Tumors wird allmählich geschnitten, der Tumor schichtweise lospräpariert. Blutung ziemlich stark, teils durch sofortige Unterbindung, teils durch Torsion der Gefässe gestillt, die Wundfläche mit der Scheere geglättet und die Wundränder in Längsrichtung genau vereinigt, die Wunde mit Jodoform gehörig belegt, zu gleicher Zeit die *Vagina* mit Jodoformgaze lose austamponiert. Auf die Wunde Gaze gelegt, welche durch Sandkissen in ihrer Lage festgehalten wird.

Weiterer Verlauf.

11. Sept. Abends. Entfernung der Jodoformgaze von der Wunde. Letztere nicht geschwollen. Katheterisation. Neue Gaze auf die Wunde.

12. Sept. Abspülung der Wunde mit Sublimat. Neuer Verband. Patientin klagt über Kopfschmerzen.

13. Sept. Verbandwechsel.

14. Sept. Neuer Verband. Wunde nicht geschwollen und nicht gerötet.

15. Sept. Entfernung eines Teiles der Nähte, der grösste Teil der Wunde ist primär geheilt, nur an einzelnen Stellen klaffen die Wundränder.

16. Sept. Verbandwechsel. Verband mit Bindentouren befestigt. Patientin verlässt das Bett.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung. 20. Sept. Am rechten Labium eine 6 cm lange zerklüftete granulierende Wundfläche. Sonst keine Beschwerden. Entfernung des nach

der Operation eingelegten Scheidentampons. Derselbe ist blut durchtränkt, nicht riechend. Das Blut entstammt der Periode.

Sitzbäder. Abwaschungen der Wunde. *Unguentum argent. nit.*

Hieran dürfte man eine als *Molluscum simplex* beschriebene Geschwulstform anreihen, die ihren Ursprung in kleinen elephantiasischen Heerden der Vulvarhaut hat. Hildebrandt¹⁾ schreibt dieselbe als kuglige, knollige, oft aber auch lappige Geschwulst mit dünner glatter Epidermis, die bei raschem Wachstum den Boden hinter sich ziehen kann und so zu einer gestielten Geschwulst wird, welche in Form und Struktur dem aus dem Uterus vorgetretenen fibrösen Polypen sehr nahe steht.

Ganz ähnlich der papillären Form der *Elephantiasis* und mit dieser zu verwechseln sind die *Condylomata acuminata*, auch unter den Namen *Vegetations dermiques*, *Papillom* bekannt.

Wir können sie wohl deshalb ganz passend an die *Elephantiasis* anschliessen. — Ihre Entstehung verdanken sie fast ganz nahtlos einer Wucherung der Hautpapillen; jedoch können auch tiefer liegende Teile der Haut den Boden für ihre Bildung abgeben, da sie sich auch an Stellen vorfinden, „wo Hautpapillen sich nicht immer nachweisen lassen“ (Hildebrandt).

Sie bilden Geschwülste, die entweder diffus sich entwickeln und dann sehr klein (und kaum einzeln sichtbar) sind, oder gruppieren sich zu „blumenkohlähnlichen, warzig rissigen, beerförmigen, höckrigen, oft monströsen Tumoren“ und gerade diese grossen Condylomformen sind es, von denen Förster sagt, dass, je grösser sie werden, desto mehr das subcutane Zellgewebe in Form massiger fibröser Hypertrophie an der Veränderung Teil nimmt, und so Geschwülste entstehen, welche im Übergang zur Elephantiasis bilden und oft auch für solche gehalten worden sind. Zu solchen umfangreichen Tumoren wachsen diese Neubildungen allerdings bloss unter besonders günstigen Verhältnissen, wie mit Vorliebe zum Beispiel in der Schwangerschaft.

Ihre Entstehung dürfte wohl stets auf spezifische Infektion mit Trippergift zu beziehen sein (Fritsch³⁾).

1) H. Hildebrandt, Die Krankheiten der äusseren weiblichen Genitalien. Stuttgart 1877.

2) Dr. A. Foerster, Handbuch der speziel. path. Anatomie. Leipzig 1884.

3) H. Fritsch, Die Krankheiten der Frauen. Braunschweig 1884.

Zu dieser Kategorie von Neubildungen könnte man noch hinzurechnen die sogenannten Carunkeln, Schleimhautpolypen, Exerescenzen, die entweder in der Schleimhaut des unteren Endes der Urethra oder an dem das *orificium urethrae* umgebenden Schleimhauttringe vorgefunden werden (Foerster). Sie gehen hervor aus partieller Hypertrophie der Urethralschleimhaut, bestehen aus lockerem Bindegewebe, zahlreichen Gefässen, die in der Peripherie papillenartig sprossen, Schlingen ausschicken und mit Epithel überzogen sind. Sie sind meist klein und haben nach dem Ursprung in der Urethra einen verschieden langen Stiel. Reichen nun diese Polypen mit ihren Stielen weit in die Urethra hinein, so verlieren sie ihren anfangs ziemlich unschuldigen Charakter durch ihre unangenehmen Symptome, die sie den Kranken hervorrufen.

Für die beiden Formen der unter diesem Abschnitt genannten Neubildungen erlaube ich mir je einen Fall zu publizieren, die unserer Frauenklinik zur Beobachtung und Behandlung genommen sind.

II. Martha L. 15 Jahr. Breslau, Holteistrasse. 6. März bis 6. März 1883.

Diagnose. *Condylomata acuminata labii majoris utriusque, sinistri et inferioris partis vaginae.*

Uebersicht. Jederseits Umschneidung der Condylommassen und präparatorische Beseitigung; isolierte Unterbindung der Gefässe; Vereinigung der Wundflächen durch die Naht; die einzelnen Condylomwärtchen an den Oberschenkeln und in den Leistenfalten mit der Cowper'schen Scheere abgetragen; ungestörter Verlauf; primäre Heilung.

Frühere Krankheiten. Als Kind an den Masern gelitten; im ersten Jahr beide Füße erfroren.

Bisherige Therapie. Vom 8. Februar bis 3. März im Krankenhaus des Dr. H. in Waldau bei Kohlfurt, Kr. Bunzlau, mit kalten Bädern, Ätzungen mit arg. nitr., Tinctur. Jodi und Calomel in Salzwasser, darauf mit Jodoform erfolglos behandelt.

Jetzige Krankheit. Am 9. September wurde Patientin beim Zurechtmachen der Betten von einem Unteroffizier überfallen, auf das Bett geworfen und genotzüchtigt. Bald darauf bekam Patientin Schmerzen und Brennen beim Urinieren, die erst nach vierzehn Tagen verschwunden waren. Der Urin war

angeblich immer klar. Drei Wochen nach dem Coitus bemerkte die Kranke im *Introitus vag.* an dessen hinterer Hälfte mehrere kleine hühnerwurzelnähnliche Excrescenzen, die sich, da Patientin keinen Arzt consultierte, sich nicht rein hielt und im Dienen angestrengt thätig sein musste, schnell vermehrten und die ganzen äusseren Genitalien inbegriffen. Dickeitriger Ausfluss und infolgedessen Brennen im Schoosse gesellten sich dazu und hinderten die Kranke seit der letzten Zeit auch im Gehen. Eine im Krankenhause zu Waldau angefangene Behandlung blieb erfolglos. Stuhl- und Urinbeschwerden bestehen in der letzten Zeit nicht mehr.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien Brennen im Schoosse, dickeitriger Ausfluss, infolgedessen Beschwerden und Schmerzen beim Gehen.

Objektiver Befund. Äussere Untersuchung. Kleine, etwas blasse, sonst gut genährte Blondine, Mammæ in der Entwicklung. Brustorgane gesund; an der hinteren Perinealwalde ein 1 cm breiter, langer, scharfrändiger, etwas nekrotisch belegter, meist schon granulierender Schleimhautdefect. Submaxillärdrüsen geschwellt und induriert; am Körper ein abgeblasstes maculöser, etwas schmutziggelb verfärbter, an mehreren Stellen confluierender Ausschlag, besonders an Brust, Bauch, Rücken und Oberextremitäten. Inguinaldrüsen beiderseits stark geschwellt und induriert, schmerzhaft, Haut darüber nicht gerötet und verschieblich. Die grossen Labien und die Labiofemoralfalten, sowie das Perinaeum bis zum Anus reichlich mit spitzen Condylomen besetzt mit stellenweise oberflächlichem Zerfall und stinkendem Ausfluss; die obere Hälfte der Schleimhautfläche der grossen Labien frei von Excrescenzen.

Diagnose. *Condylomata acuminata labii majoris utriusque perinaei et partis inferioris vaginae.*

Therapie. Nachdem Patientin durch Abführkur, Sitzbäder und 3% Carbolüberschläge genügend vorbereitet, wurde am 8. März 1883 die Operation vorgenommen; Chloroformnarkose, Steissrückenlage, Beinhalter. Jede der grossen Labien wird nach einander aussen und innen in der Weise unterseits geschnitten, dass die condylomatösen Parteen zwischen beiden Schnitten zu liegen kommen; die beiden Schnitte einer jeder Lippe treffen sich am Mons Veneris und am Perinaeum; c

anken Abschnitte werden nun von diesen Schnitten aus abpräpariert, wobei eine grosse Menge kleiner Arterien spritzen. Die-
 lichen werden mit Pincetten gefasst und dann einzeln ligiert. Die
 undflächen jeder Seite werden sorgfältig durch eine Menge
 ansversaler Nähte (Seide) vereinigt, so dass zwei etwas nach
 n Schenkeln hin concave, sagittale Wundlinien entstehen; die
 reinzelten Condylomata an den Innenflächen beider Oberschenkel
 d im untern Scheidenabschnitt werden mit Scheere oder schar-
 m Löffel entfernt und nachträglich mit dem Paquelin kaute-
 iert, hierauf alle Wunden mit Jodoform bepulvert und mit
 doformgaze bedeckt, nachdem vorher ein Verweilkatheter in
 e Urethra eingeführt ist, da voraussichtlich Schwellung und
 mit Harnretention eintreten und eine Katheterisation dann sehr
 schwer sein dürfte.

Weiterer Verlauf.

März 1883. Nicht gebrochen; kein Fieber; Gaze stark durch-
 blutet, festgeklebt an den Wundflächen, beim Abziehen geringe
 Blutung aus den Wundflächen der Vulvofemoralfalten; keine
 Schwellung; keine Schmerzen; Scheide ausgespült; Flüssigkeit
 blutig gefärbt; *retentio urinae*; während der Nacht Verweil-
 katheter eingelegt; am Tage mehrere Male katheterisirt.

März. Kein Fieber; grosse Labien ganz wenig geschwollen;
retentio urinae; Katheterisation; Scheidenausspülung; Jodoform
 und Gaze vor die Genitalien; Urin klar und unblutig.

. März. Kein Fieber; Urin seit heut spontan gelassen; Stuhl
 spontan; keine Schwellung, keine Schmerzen; alles primär
 geheilt; geringe poröseitrige Secretion aus der Scheide; Aus-
 spülung derselben; Jodoform und Gaze vor die Genitalien.

. März. Kein Fieber; sämtliche Nähte entfernt; alles pri-
 mär geheilt; Stuhl- und Urinentleerung normal; nirgends
 Schmerzen oder Schwellung, nur noch eitriger, geringer Vagi-
 nalfluss; Ausspülung; die an der inneren Fläche der Ober-
 schenkel befindlichen Wunden gut granulierend.

. März. Patientin steht auf, wird in Nichts bei Bewegungen
 behindert, hat auch keine Schmerzen.

. März. Entlassung.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung

. März 1883.

Jederseits eine lineare, nach dem Oberschenkel hin con-

vexe, am Mons Veneris beginnende und bis dicht vor dem Anus endende, auf Höhe der grossen Schamlippe verlaufende Narbe; nach aussen von derselben mehrere kleine im Niveau der Harnröhre gelegene, gut granulierende Wundflächen; Hymen fehlt; Frenulum erhalten; Scheide lang; Introitus bequem für den Finger durchgängig. Portio und uterus virginell, normal gelagert; kein Scheidenausfluss; Stuhl und Urinentleerung ohne Beschwerden und normal.

III. Henriette B., geb. B., 64 Jahr. Breslau. Wittwe seit 8 Jahren. 8 Entbindungen, immer spontan. Letzte vor 16 Jahren. Aborte: einer vor langen Jahren. 9. Jan. bis 11. Jan. 1884.

Übersicht: Erbsengrosse, sehr empfindliche und äusserst lästige Symptome machende, von der Schleimhaut der Harnröhre nach ihrer Mündung entspringende Carunkel. Abtragung mittelst Scheerenschnittes, geringe Blutung, Heilung. Menstruation: Zuerst mit 14 Jahren. Später regelmässig alle 4 Wochen reichlich, schmerzlos, von 3—4 tägiger Dauer. Cessiert seit 10 Jahren.

Diagnose: *Caruncula urethralis*.

Bisherige Therapie: Von Dr. Fränkel mit Sitzbädern.

Jetzige Krankheit: Seit etwa 3 Jahren stechende Schmerzen im Schooss, besonders bei körperlicher Anstrengung. Seit einigen Monaten Schneiden beim Wasserlassen. Stuhlgang regelmässig. Die Schmerzen werden bei stärkerer Anstrengung (Heben) zuweilen so intensiv, dass es Patientin vorkam, als wenn unter der Gebärmutter austräte, als wenn sie niederkommen sollte etc.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien: Heftige Schmerzen im Unterleib, Schneiden beim Wasserlassen. Von Seiten des übrigen Körpers: Allgemeine Schwäche, Husten, Brustschmerzen (anscheinend Phthise).

Objektiver Befund. Äussere Untersuchung: Kleine, schlecht genährte, kachektische Person. Zunge belegt, Appetit mässig. Beide Lungen zeigen Spitzendämpfung, zerstreute expiratorische Rasselgeräusche und hier und da Rhonchi. Herztöne rein. Markmae atrophisch hängend. Abdominalorgane bieten nichts Abnormes. Enger senil involvierter Scheideneingang, klaffende Rima. Aus der äusseren Urethralmündung ragt ein erbsengrosses, dunkelrotes, glattes, gestielt aus der Harnröhre entspringendes, weiches Knötchen, dessen leiseste Berührung die heftigsten Schmerzen

ervorrufen. Innere und kombinierte Untersuchung: Wegen grosser Schmerzhaftigkeit und als überflüssig unterlassen.

Diagnose: *Caruncula urethralis*.

Therapie. Entfernung des kleinen Tumors (in Narkose, weil in der Klinik vorgestellt) mittelst einfachen Scheerenschnittes, geringe Blutung, durch *Liqu. ferri* leicht gestillt. Jodoformtaze vor die Vulva.

Weiterer Verlauf:

10. Januar. Gutes Befinden, Symptome unmittelbar nach Beseitigung der Geschwulst verschwunden, keine Schmerzen beim Urinieren.

11. Januar. Entlassung.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung. Alle früher durch das Bestehen der Carunkel hervorgerufenen Erscheinungen vollständig geschwunden. Keine Schmerzen mehr beim Urinieren.

Eine weitere Geschwulstform, die mit der *Elephantiasis vulvae* sehr viel Ähnlichkeit hat und ebenfalls an der Vulva beobachtet worden, ist der *Lupus vulvae*.

Unter dem Namen *Esthyomène* von den Franzosen zuerst beschrieben, ist der Lupus seinen äusseren Erscheinungen nach bald zu carcinomatösen, bald zu luetischen oder zu elephantiasischen Geschwülsten gerechnet worden. Jedenfalls hat derselbe, wie schon oben erwähnt, mit der *Elephantiasis* viel Ähnlichkeit, unterscheidet sich aber durch die schnelleren und grösseren Zerstörungen von derselben. Diese lupösen Affectionen, nach heutigen wissenschaftlichen Anschauungen identisch mit lokaler Tuberkulose der Haut, stellen hier Tumoren dar, welche teils aus neugebildetem Bindegewebe, teils aus Granulationsknötchen und necrotischen Herden sich zusammensetzen und meist mit entzündlichen, braunen zum Teil auch mit papillösen nässenden und mit Epithelschicht und Borken bedeckten Wucherungen bedeckt sind (Ziegler¹⁾). Natürlich finden wir im besonderen auch unter diesen Bildungen sehr variierende Formen vor, die sich aber in grossen Ganzen unter folgende drei Gruppen unterbringen lassen.

1) *Lupus hypertrophicus*: charakterisiert durch schnelle Wucherungen, Hyperplasie und Induration des Bodens der Geschwulst —

¹⁾ E. Ziegler, Lehrbuch der speciellen Pathologie. Jena 1884.

meist die grossen Labien betreffend — und Bildung grösserer umfangreicherer Knollen.

- 2) *L. perforans*: mehr Geschwürsform, die sich durch die Neigung in die Tiefe zu dringen auszeichnet.
- 3) *L. serpiginosus*: eine Erkrankung, die am mons Veneris beginnt und sich flächenhaft in bestimmter Richtung ausbreitet und Vernarbungen an den betreffenden Stellen zurücklässt.

Von den malignen Neubildungen ist an der Vulva besonders das *Carcinom* beobachtet worden.

Das *Carcinoma vulvae* ist seltener als das *Uteruscarcinom*, aber häufiger als die gleichnamige Affection an der Vagina. Nach älteren statistischen Angaben von Virchow, Louis Mayer, Marc d'Espine und Tanchon, kommt auf 35—40 Fälle von Uteruskrebs nur 1 Fall von *Carcinom* der äusseren Genitalien.

Das *Carcinom* bildet hier, durch die verschiedenen Krebsformen, wie *Cancroide Scirrhen*, *Medullarcarcinome*, repräsentiert meist von der Clitoris oder von einer der grossen Labien ausgehend, circumscripte Knoten, die gern bald aufbrechen und ulcerieren, auch die Tendenz haben in die Tiefe zu dringen und sogar die Beckenknochen krebssig afficieren können.

Auch melanotische Krebsknoten will in einem Falle Klob¹⁾ an den Schamlippen einer alten an ausgebreiteter melanotische Carcinomatose verstorbenen Frau gesehen haben. Jedoch scheint dieses Vorkommen sehr selten zu sein.

Wir haben aus unserer Klinik über 6 Fälle von Vulvacarcinom zu berichten, von denen zwei auf je eine Hälfte der Vulva sich beschränkten. Der zweite Fall ist auch deshalb besonders interessant, weil es eine noch sehr jugendliche Person — Patientin war erst 16 Jahre — betraf. Bei den drei folgenden Fällen war der Sitz der Affection die Clitoris, von wo aus aber das einmal die Erkrankung auf die kleinen und grossen Labien überging. Im sechsten Falle endlich handelte es sich um ein *Carcinoma recidivum*. Wir lassen die betreffenden Krankengeschichten folgen:

IV. Frau Christiane Z. aus Freiburg i./Schl. 58 Jahre. 21. September bis 15. Oktober.

Seit 1½ Jahre Witwe. Entbindungen 7. Bei der letzte

1) J. Klob, Path. Anat. der weiblichen Sexualorgane. Wien 1864.

Entbindung vor 17 Jahren Querlage und Wendung, die übrigen Geburten normal. Im Wochenbett gesund. Ein Abort vor 10 Jahren. Sonst stets gesund. Menstruation regelmässig alle vier Wochen. Seit 9 Jahren Menopause.

Jetzige Krankheit. Schmerzen in der Gegend der Clitoris und Beschwerden beim Urinieren. Die grossen Schmerzen hindern die Patientin im Gehen und treten bei Bewegungen mehr auf, während sie bei ruhiger Lage bedeutend vermindert sind. Die Beschwerden beim Urinieren charakteristisch vor allem dadurch, dass Patientin noch unter Unterstützung der Bauchpresse Urin lassen kann und doch auch hinterher die Schmerzen beim Urinieren in der Gegend der Clitoris stärker werden.

Vor 9 Monaten bemerkte Patientin zum ersten Male in der Gegend der Clitoris einen haselnussgrossen Tumor, der sich ziemlich hart anfühlte und schmerzlos war. Allmählich vergrösserte sich der Tumor und wurde infolge des fortwährenden Reibens der Rösche sehr schmerzhaft und hinderte die Patientin beim Gehen. In den letzten Wochen traten noch Beschwerden beim Urinieren auf.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien: Schmerzen in der Gegend der Clitoris und Beschwerden beim Urin lassen. Von Seiten des übrigen Körpers: Patientin fühlt sich im übrigen völlig wohl und bei gutem Appetit und geregelter Verdauung.

Objektiver Befund. Alte schwächliche Person. An Herz und Lunge ist nichts Abnormes zu finden. Die Leistendrüsen sind beiderseits bohnen- und erbsengross infiltriert und nicht schmerzhaft. In der Gegend der Clitoris befindet sich ein Tumor von der Grösse einer Wallnuss, der circumscrip ist und sich leicht verschieben lässt. Die Oberfläche dieses Tumors ist leicht zerklüftet und an einzelnen Stellen mit einem Eiterbelag bedeckt. Vagina und Uterus senil involviert. Nichts Pathologisches zu finden.

Diagnose: *Carcinoma clitoridis* und Induration der Leisten-
drüsen.

Therapie: Operation 26. September 1883. Die Operation, welche mehrere Tage vorher durch Bäder und entsprechende Diät vorbereitet war, wurde unter Chloroformnarcose ausgeführt, der Tumor der Clitoris wird durch zwei rechts und links von

demselben bogenförmig geführten Schnitte, die sich nach oben am oberen Rande der Symphyse und nach unten dicht an der Harnröhrenmündung vereinigen, exstirpiert. Die Schnitte sind so angelegt, dass sowohl seitlich vom Tumor als auch in der Tiefe gesundes Gewebe durchtrennt wird. Die spritzenden Arterien werden unterbunden und die ziemlich tiefe Wunde durch eine Naht unter fortwährender Berieselung mit 2% Carbollösung gut vereinigt. Die indurierten Leistendrüsen werden ebenfalls exstirpiert. Ein Schnitt, der ungefähr 1 cm lang ist und rechts und links in dem Poup. Bande geführt wird, trennt die Haut. Die niedersten Drüsen werden hierauf teils stumpf, teils mit dem Messer und der Scheere entfernt. Hierbei war aber nötig auf der linken Seite sehr tief zu gehen. Eine stärkere Blutung trat nicht ein. Die durch die Exstirpation der indurierten Drüsen notwendig gewordene Unterminierung der Haut wurde sorgfältig ausgestopft, mit Jodoform bestreut und die Wunde durch je sechs Suturen vereinigt. Die Anlegung eines Jodoformverbandes, welcher die Leistenwunde fest comprimierte, beendete die Operation. Die durch Exstirpation des Tumors der Clitoris entstandene Wunde wird, da hier die Anlegung eines festen Verbandes unmöglich ist, durch Jodoformgaze sorgfältig bedeckt.

Weiterer Verlauf:

27. Sept. Abends geringe Temperaturerhöhung. Allgemeinbefinden gut. Appetit gut. Nachts hat die Patientin gut geschlafen. Die Wunde der Clitoris ist geschwollen, doch schmerzlos. Dieselbe wird täglich zweimal mit 3% Carbollösung abgetupft und mit frischer Jodoformgaze bedeckt. Die Patientin klagt über sehr erschwertes Urinieren, doch ist es ihr noch möglich, spontan Urin zu lassen.
28. Sept. Abends geringe Temperaturerhöhung. Geschwulst der Clitoriswunde ist nicht kleiner geworden. Die Behandlung ist dieselbe. Die Patientin vermag nicht spontan zu urinieren und wurde infolgedessen zweimal täglich katheterisiert.
29. Sept. Clitoris ist geschwollen und schmerzhaft. Die Nähte werden entfernt, worauf sich eine ziemlich grosse Menge blutig gefärbter Eiter entleert. Die ganze Wundfläche ist mit einem dicken zähen Eiterbelag bedeckt. Die Wunde wird täglich zweimal mit 2% Carbollösung ausgespült und mit in Campherwein getränkter Watte bedeckt. Abends geringes Fieber. Allgemeinbefinden gut.

30. Sept. Fieberfrei. Das Befinden der Patientin ist ein gutes, sie kann heute zum ersten Male Urin lassen. Die Behandlung der Wunde ist dieselbe.

1. Okt. Fieberfrei. Die Clitoris wird täglich zweimal mit Chlorzinklösung betupft und mit in Campherwein getauchter Watte bedeckt. Der eitrigschmutzige Belag ist noch nicht verschwunden, doch zeigen sich an einzelnen Stellen junge Granulationen. Allgemeinbefinden gut.

3. Okt. Entfernung des Verbandes der Inguinalwunden. Die Wunde ist vollständig geheilt und werden die Nähte entfernt. Die Behandlung der Clitoriswunde bleibt dieselbe.

5. Okt. Stat. idem.

7. Okt. Langsame Granulation, Einlegen von Schwarzsalbe auf einem Tampon. Tägliche Irrigation der Wunde.

10. Okt. Gute Granulation. Borsalbe.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung. Senile Atrophie der Sexualorgane. Wunde sieht frisch aus und ist mit Granulationen bedeckt. Als geheilt entlassen mit Borsalbe zum täglichen Einlegen.

V. Laura G., bei den Eltern, 16 Jahre, ledig, aus Halbendorf bei Glatz. 2. Mai bis 29. Juni 1882.

Diagnosae: *Vulvae carcinoma*.

Übersicht: Abschnürung der carcinomatösen Partien; Behandlung der erhaltenen Wundfläche mit Jodoform; fieberhafter Verlauf, während dessen ein phlegmonöses Erysipel bei den Inguinalgegenden sich etabliert und beiderseits ebendasselbst Bubonen auftreten; Incision, Drainage, Heilung derselben; allgemeine Anämie; gebessert den 29. Juni entlassen.

Menstruation. Erste Menstruation mit 14½ Jahren schmerzlos, schwach, darauf regelmässig. Seit einem Jahre jedoch treten die Blutungen in Pausen von 3 Monaten und stärker als früher auf.

Frühere Krankheiten: Als Kind Schafblattern.

Bisherige Therapie: Behandelt von zwei Ärzten (Dr. F. und K.) mit einem gelben Pulver und mit einer nach der Injektion sich grün färbenden Flüssigkeit.

Jetzige Krankheit: Seit 3 Jahren wird Patientin von einem fortwährenden, Tag für Tag, mit nur geringen Pausen, wiederkehrenden Kitzel an den äusseren Geschlechtsteilen und in der

Vagina belästigt, welcher Kitzel auch bis in die Nacht andauert und die Kranke am Schläfe hindert. Um diesen zu erlangen und sich Linderung zu verschaffen, krimmert und kratzt sie sich an den betreffenden Teilen und sucht das unangenehme Gefühl durch kräftige Adduktion beider Schenkel zum Verschwinden zu bringen. Ungefähr zwei Monate vor Weihnachten 1881 trat eine allmählich zunehmende Anschwellung der grossen Labien ein, welche immer mehr fortschritt, während der Kitzel weiter bestand. Schmerzen während des Wasserlassens bestanden seit Beginn der Krankheit. Der Urin war stets frei von Blut und von normaler Beschaffenheit. Defaecation ungestört. Seit Weihnachten stellte sich unangenehmer Geruch von Seiten der erkrankten Partien ein, sodass es Niemand um die Patientin aushielt.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien: Fortwährender Kitzel, übler Geruch und eitriger Ausfluss aus den Genitalien, Schmerzen während des Wasserlassens.

Objektiver Befund. Äussere Untersuchung. Kleine blassere Person, von mittlerem Ernährungszustande. Brust- und Bauchorgane gesund. Das rechte Labium majus ist in einen circa 8 cm langen, 3 cm. breiten und auf der höchsten Höhe circa 4 cm hohen, harten, von normaler Haut überzogenen und auf Druck schmerzlosen Tumor verwandelt, welcher durch das rechte ebenfalls indurierte und vergrösserte frenulum labii posterius mit der in der gleichen Weise entarteten hinteren Hälfte der linken grossen Schamlippe in Verbindung steht. Die Rima erscheint über der entarteten hinteren Commissur in Folge der harten Anschwellung der umgebenden Teile klaffend. Beim Auseinanderklappen der beiden Partien zeigt sich die Schleimhautfläche derselben in eine blassrötliche, höckrige, mit kleinen, stärker als ihre Umgebung geröteten Höckern besetzte und von der normalen Haut durch eine weisse Linie scharf abgegrenzte Fläche verwandelt, welche einen wässerigen, übelriechenden, mit kleinen grünschwarzen Fetzen durchsetzten Eiter in reichlicher Menge secerniert. Die Umgebung der grossen Labien, als die oberen Abschnitte der inneren Flächen beide Oberschenkel, der Mons Veneris und die Inguinalfalten beiderseits ebenfalls induriert und auf Druck schmerzlos. Eine links oberhalb der Mitte des lig. Poupartii gelegene oberflächliche Inguinaldrüse bis Wallnussgrösse angeschwollen, hart, schmerzlos, verschieblich, von normaler Haut

bedeckt. Clitoris, sowie beide Nymphen fehlen vollkommen und man gelangt mit der Sonde beinahe 4 cm hoch oberhalb des oberen Symphysenrandes unter den Schamberg, ohne auf rauhe entblösste Knochen zu stossen. Hymen intact. Die Urethralmündung nach hinten dislociert.

Diagnose: *Labiorum majorum et minorum et clitoridis Carcinoma.*

Mikroskopischer Befund. Die mikroskopische Untersuchung der exstirpierten Parteen ergibt ein deutliches alveoläres Carcinom, das von den Schleimhautflächen der grossen Labien ausgegangen.

Therapie: 8. Mai 1882. Steissrückenlage. Fritsch'sche Beinhalter. Nach Desinfection des Operationsfeldes wird die ganze rechte Schamlippe durch mehrere dicht neben einander liegende starke Ligaturen abgebunden. Dasselbe geschieht mit der hinteren Hälfte der linken und der entarteten hinteren Scheidencommissur. Die ligierten Parteen werden mit einer starken Scheere exstirpiert und die Schnittfläche, welche dicht oberhalb der Ligaturen angelegt, wird mit dem Paquelin geätzt. Die unter dem Mons Veneris befindliche Höhle, sowie das entartete Vestibulum vaginae werden mit dem scharfen Löffel gereinigt. Zwei kleine spritzende Arterien werden umstochen. Der Blutverlust gering. Von einer Exstirpation der oben besagten linksseitigen superficiellen Inguinaldrüse wird abgesehen.

Weiterer Verlauf:

9. Mai. Fieberbewegung zwischen 38,7 und 39,8, dementsprechende Pulsfrequenz. Die Umgebung beider Inguinalfalten ist bis zur Crista ilei hin, sowie die oberen Parteen der inneren Oberschenkelflächen intensiv gerötet, auf Druck schmerzhaft, die Haut, besonders in beiden Leistenbeugen, gespannt und glänzend: Befunde, die bereits vier Tage vor der Operation zu constatieren waren und teilweise auf zu starke Carbollösungen, mit welchen kühlende Umschläge gemacht wurden, zurückzuführen sind, Secretion von mittlerer Stärke, übelriechend. Tägliche zweimalige Ausspülung. Überschläge von Carbolläppchen. Urin- und Stuhlentleerung ohne Schmerzen; Eisbeutel.

11. Mai. Status idem. Die linksseitige oberflächliche Inguinaldrüse erweicht, fluctuierend, ihre Umgebung etwas geschwellt,

- sehr schmerzhaft. Eine Zunahme der Schwellung auch rechterseits wahrnehmbar. Therapie dieselbe.
12. Mai. Jederseits eine ca. 3 cm lange, parallel mit dem lig. Poupartii verlaufende, der höchsten Höhe der Intumescenz entsprechende Incision entleert eine Menge guten, nicht riechenden Eiters. Ausspülung und Drainage der Höhlen.
15. Mai. Da rechterseits die eine angelegte Incisionsöffnung nicht genügend, sich vielmehr eine ganz subcutan gelegene, nach aussen an die spina ant. sup., nach innen beinahe bis an den Mons Veneris, nach unten bis dicht an das lig. Poupartii reichende Höhle gebildet hat, werden an den abhängigsten Parteen mehrere Gegenöffnungen gemacht und Drainage eingeleitet. Zur Reinigung der Wunden ein warmes Vollbad mit Kali hypermangan. Nachlass der Rötung und Spannung der Haut; bedeutend geringere Schmerzhaftigkeit der geröteten Parteen, profuse Secretion guten Eiters, spontane Abstossung der ligierten Parteen. Gutes Aussehen der dadurch bedingten Wundflächen. — Decubitus in der Gegend der Steissbeinspitze.
17. Mai. Neue Incisionsöffnung oberhalb der linken spina ant. sup.; sonst status idem. Von heute an täglich ein warmes Vollbad.
20. Mai. Einpulvern der Incisionsöffnungen mit Jodoform. Von heute ab täglich zwei Vollbäder. Beim Urinieren Brennen in den Genitalien.
23. Mai. Bepinseln der Wundhöhle mit Jodoformcollodium.
29. Mai. Anlegen von 2 Incisionen unterhalb der rechten Leistenbuge. Entleerung einer Menge guten Eiters. Patientin verlässt Nachmittags auf einige Stunden das Bett.
31. Mai. Täglich Morgens ein Vollbad mit Kali hypermangan. zur Reinigung der Wunden. Trennung einer rechtsseitigen, zwischen zwei Incisionsöffnungen sich stark spannenden Hautbrücke. Mehrere Incisionen rechts und links, sowie die dieselben verbindenden Canäle verklebt. Jodoform in die Höhlen. Jodoformurin. Die Wundfläche der Labien vernarbt langsam. Rechts zeigt sich in der normalen Haut ein Knötchen; auch sind mehrere Andeutungen derselben in den Wundflächen vorhanden. Bepinseln mit Jodoformcollod. Compressionsverband.
1. Juni. Kein Verbandwechsel. Patientin verbringt den Tag ausser Bett.

Juni. Verbandwechsel. Befund wie am 31. Mai. Compressionsverband. Geringes Brennen beim Urinieren.

Juni. Verbandwechsel. Bad. Vier Incisionsöffnungen geschlossen, 2 gut granulierend. Jodoform. Unterhalb der linken Leistenbeuge in der Gefässgegend eine circumscripte, gerötete, fluctuierende schmerzhaft Partie.

Juni. Vulvarwunde sich langsam von der Peripherie her überhäutend. Rechts ein kleiner Lupusknoten in der Wundfläche. Jodoformcollodium.

Juni. Auskratzen des neugebildeten Knötchens in der Wundfläche.

Juni. Nach einem Vollbade am Morgen Compressionsverband auf die beiden noch nicht geschlossenen Incisionsöffnungen. Vulvarwunde von gut granulierendem Aussehen, langsam von der Peripherie her vernarbend. Die unter dem Mons Veneris befindliche Vertiefung hat sich trotz Jodoform nicht verkleinert.

Juni. Verbandwechsel. Vollbad. Beiderseits die Höhlen beinahe vollkommen zugranuliert. Die Vulvarwundflächen vernarben ebenfalls langsam von der Peripherie her, jedoch ist rechterseits her wiederum eine Andeutung eines frischen Knötchens zu erkennen.

Juni. Patientin ging heute zum ersten Male im Hofe spazieren.

Juni. Seit vorgestern Schmerzen beim Laufen im rechten Knie, in der Leistenbeuge und an der Aussenseite des Oberschenkels. Das Bein wird beim Laufen möglichst geschont und adduciert, nach innen rotiert, gehalten. Oberschenkel und Knie etwas angeschwollen. Coxitis. Schmerzpunkte nicht sicher angeben. Patientin ist im allgemeinen sehr kachectisch und anämisch. Hat zwar beim Atmen keine Schmerzen, wird jedoch häufig von Husten geplagt und wirft aus. Da die Wunden auf Druck durch den Verband nicht schmerzen, wird letzterer nicht gewechselt. Stuhl und Urin in Ordnung. Rorierende Diät. — *Liniment. saponato — camphor.*

Beschwerden und Befund bei der Entlassung 29. Juni 1902. Patientin fühlt sich schwach und klagt über Schmerzen im rechten Knie, welches weder angeschwollen noch gerötet ist. Das Gehen fällt ihr schwer, sie wird daher auf einem Stuhl in den Wagen getragen. Herz und Lungen gesund. Patientin sehr anämisch und schwach. Von den äusseren Genitalien ist nur die obere Hälfte der linken grossen Labie erhalten. Clitoris und

Nymphen fehlen ganz und an ihrer Stelle befindet sich eine granulierende, von der Peripherie her überhäutende Wundfläche, welche sich auch unter den Mons Veneris erstreckt und daselbst eine Höhle bildet. Die Urethralmündung ist analwärts verschoben und ohne weiteres nicht sichtbar. Beschwerden beim Urinieren bestehen nicht; Hymen erhalten. Die inneren Genitalien normal, wie die Exploration per rectum ergibt.

VI. Caroline R., geb. W. aus Rawitsch. 78 Jahr. 2. Dezember bis 16. Dezember 1884. 19½ Jahr verheiratet gewesen. Witwe seit 40 Jahren. 8 Entbindungen, immer spontan, zuletzt vor 46 Jahren. Im Wochenbett stets gesund. Aborte: Zweimal, zuletzt vor 50 Jahren. Menstruation: Seit 37 Jahren Menopause.

Frühere Krankheiten: Stets gesund gewesen.

Bisherige Therapie: In letzter Zeit von Dr. G. in Rawitsch behandelt.

Jetzige Krankheit: Seit vier Monaten bemerkt Patientin nach sehr angestrenzter Arbeit und starkem Schwitzen, dass ein Geschwür in dem Schosse entstand, welches immer mehr zunahm, sodass Patientin im Gehen behindert war. Dabei keine Schmerzen, keine Eiterung. Nur leichtes Brennen und Stechen im Schoss. Beim Wasserlassen Brennen; dasselbe normal. Stuhlgang regelmässig. Appetit gut, ebenso Schlaf. In letzter Zeit sind auch die Beine öfter angeschwollen infolge von starken Venectasien.

Objektiver Befund. Äussere Untersuchung: Mittelgross, kräftige, sehr fette, sonst gesunde Person. Abdomen hängen, schmerzfrei. Die linke Vulva von einem unregelmässigen, flächenhaften Geschwür eingenommen, das nicht blutet. Die Oberfläche ist mit einem weissen Belag belegt. Das Geschwür geht noch etwas auf die Vagina über und nach unten reicht es ein wenig bis auf die untere Partie der rechten Vulva. Drüsen nicht infiltriert.

Innere und kombinierte Untersuchung: Senile Involution der Genitalien; kein Ausfluss, keine Blutungen.

Diagnose: *Carcinoma vulvae sinistrae*.

Therapie: Vorbereitet mit Sitzbädern und Sublimatcompressionen. Operation 4. Dezemb. 1884 (Excision). Die ganze Geschwürfläche wird mit den Fingern in die Höhe gehoben und durch die Basis einige lange Nadeln hindurchgeführt; hierauf Abtragung des circumcidierten Stückes. Einzelne Arterien gefasst und sofort

verbunden. Blutung durch feste Vereinigung der Wundränder gestillt. Jodoformgaze in die Vagina gelegt. Die Wunde wird vom zweiten Tage an mit Sublimatcompressen behandelt.

Weiterer Verlauf ohne Störung; ein kleines Stück im unteren Wundwinkel hat sich nekrotisch abgestossen; sonst ist die Wunde unter Sublimatcompressen geheilt.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung 16. December 1884. An der linken Vulva sieht man die grösstenteils geheilte Wunde; nur in der unteren Ecke ist eine granulierende, secernierende Stelle. Entlassen: Sitzbäder, Vaginalirrigationen.

VII. Johanna C. 66 Jahre. 5. Juli — 24. Juli 1884.

Diagnose: *Carcinom. vulv. dext.*

Übersicht: Links an der rechten Vulva breites im Centrum in die Tiefe eindringendes Geschwür mit etwas eitrigem Belag. Exstirpation. Heilung. p. pr. int. Verheirathet 8½ Jahr, Witwe seit 14 Jahren. Eine Entbindung von ½tägiger Dauer, spontan, todt. Vor 22 Jahren. Im Wochenbett gesund. Zweimal Aborte, im 6. Monate vor 18 Jahren. Menstruation zuerst mit 18 Jahren, regelmässig alle 4 Wochen, mässig stark, 2—3 Tage lang, ohne Schmerzen, seit 14 Jahren Menopause.

Jetzige Krankheit. Seit ungefähr 5 Monaten bemerkte Patientin, dass sich im Schosse eine Geschwulst bildete, die ausserordentlich schmerzte. Sie hatte das Gefühl eines stechenden Schmerzes. Sehr geringe Secretion, Appetit gut, Stuhl regelmässig. Beim Wasserlassen empfindet Patientin ein Beissen in dem Schosse. Jetzige Beschwerden. Brennen beim Wasserlassen.

Objektiver Befund. Sehr kleine 131 cm lange Person, gut genährt, Musculatur senil atrophisch, Thorax fassförmig vorgewölbt, Sternum sehr breit und fest, Rippenknorpel grösstenteils knöchern, Foss. supracl. eingesunken, beiderseitiges Lungenemphysem, Herzdämpfung grösstenteils von der Lunge überlagert, Herztöne schwach, aber rein.

Beckenmasse: Dist. cl. cris. 24, spinar. 21½ cm, Baudeloq. 25.

Innere und kombinierte Untersuchung. Die rechte grosse Schamlippe stark vergrössert, gerötet infiltriert, auf Druck ausserst schmerzhaft. Auf derselben mehr nach dem Introitus zu ein Geschwür von der Grösse einer Wallnuss. Dieses Geschwür zeigt eine tiefrote Fläche, die leicht blutet und mit

etwas Eiter bedeckt ist. Durch das Geschwür zieht von oben nach unten eine Rinne in unregelmässigen Linien. Im Centrum des Geschwüres sieht man eine trichterförmige Vertiefung, die mit eitrigem Secret angefüllt ist. Die Ränder des Geschwüres sind blassrot scharf abgeschnitten von ovaler Gestalt. Das linke Labium zeigt keine Abnormität. Vagina kurz glatt. Portio klein. Corpus senil involviert, nach vorn gelagert. An der Clitoris eine lineare Narbe, welche von einer Exstirpation derselben herrühren muss, wovon Patientin aber nichts anzugeben weiss.

Diagnose: *Carcinoma vulvae dextrae*.

Therapie. Nachdem Patientin einige Tage mit Vollbädern und Abführmitteln behandelt worden war, wurde die Geschwulst mit dem Messer entfernt und die Ränder der Wunde in der Längsrichtung vereinigt. Trockene Jodoformbehandlung.

Weiterer Verlauf.

- 14. Juli. Kein Erbrechen nach der Operation, Urin spontan.
- 16. Juli. Patientin fühlt sich sehr wohl. Stuhl regelmässig. Tägliche Bepuderung der Wunde mit Jodoform.
- 18. Juli. Fieber 39,0. Schmerzen im Unterleib. Scheidenirrigation.
- 20. Juli. Aufgestanden. Tägliche Sitzbäder.
- 24. Juli. Entlassen.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung. Patientin klagt nicht mehr über Schmerzen. Die Wunde ist bereits bis auf eine kleine Stelle (um einen Stichkanal herum) p. pr. int. geheilt. Der Befund an den Genitalien ist derselbe wie zur Zeit der Aufnahme.

VIII. Caroline P., geb. K. 62 Jahr. Aus Raden, Kr. Leobschütz. 9. Juli bis 12. August 1884. Verheiratet gewesen seit 25 Jahren. Verwitwet seit 6 Jahren. 3 Entbindungen, spontan, zuletzt vor 20 Jahren. Wochenbetten gut.

Diagnose: *Carcinoma vulvae recidivum*.

Bisherige Therapie: Im März 1884 in der chirurg. Klinik von Dr. Reichel operiert. Exstirpation des Carcinoms an dem Mons Veneris und an der Vagina, diese nicht mit exstirpiert.

Menstruation: Zum ersten Male mit 20 Jahren, darauf regelmässig alle 4 Wochen, mittelstark, von 6—8tägiger Dauer; ohne Schmerzen, Menopause seit 12 Jahren.

Jetzige Krankheit: Im Herbst 1883 begann das Leiden mit Reissen und brennenden Schmerzen im Schoss, denen sich bald eitriger, übelriechender Ausfluss zugesellte. Die Gegend des Mons Veneris und die rechte grosse Labie begannen zu schwellen, wurden hart und auf Druck empfindlich. Im März 1884 Operation. 10 Tage gelegen. Drei Monate darauf, während welcher Patientin vollkommen frei von jeglicher Beschwerde war, begann sich an der rechten grossen Labie ein Geschwür zu bilden, welches übelriechendes fetzenreiches Sekret lieferte und der Kranken Schmerzen verursachte. Gleichzeitig bildete sich auch eine Geschwulst am Mons Veneris an der Stelle der älteren Narbe, ebenfalls empfindlich. Appetit und Schlaf gut. Keine Schmerzen beim Urin- und Stuhlassens; keine Obstipation.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien: Schwellung und Schmerzhaftigkeit am Mons Veneris, Geschwür an der rechten grossen Labie; übelriechender, eitriger, mit Fetzen untermischter Ausfluss. Von Seiten des übrigen Körpers: Indurationen und Vergrösserung beider Leistendrüsen.

Objektiver Befund: Äussere Untersuchung. Mitteltgrosse, zähe, aber sonst gesunde Person, mit schmutzig gelb verfärbter Hautdecke, kein oder nur spärlicher Panniculus Mammae anil atrophiert. Brustorgane gesund. Leib flach, ohne Schmerzen eindrückbar. In beiden Inguinalgegenden vergrösserte und fast unempfindliche, auf Druck empfindliche Drüsen zu fühlen. Der Mons Veneris stark vergrössert, hart infiltriert und auf Druck schmerzhaft, in der Mittellinie zieht über denselben hinweg bis zur Legende der Urethralmündung eine lineare Narbe. Die Infiltration des Mons Veneris zieht sich auf beide labia maj. besonders auf die rechte hinab, welches in seiner hinteren resp. unteren Hälfte ein circa Fünfmarkstück grosses, unregelmässiges, zerklüftetes, gelbgrau belegtes Carcinomgeschwür mit hinten gewuldeten Rändern zeigt. Beide labia maj., wie gesagt, infiltriert und vergrössert; an ihrer Stelle das untere Ende oben erwähneter linearer Narbe. Die Urethralmündung etwas links von der Mittellinie verschoben, sonst normal; gelblicher mit Fetzen untermischter Ausfluss.

Innere und kombinierte Untersuchung: Frenulum und Clitoris erhalten. Introitus weit, Scheide mittellang, glatt und feucht, Portio kurz, dislociert, an vielen Stellen seicht einge-

rissen und hart. Corpus normal gelagert, antevertiert und schmerzlos. Parametrium frei; abgesehen von der Sekretion von Seiten des carcinomatösen ulcus keine Sekretion aus dem Genitaltract. Per rectum nichts zu fühlen

Diagnose: *Carcinoma vulvae recidivum.*

Therapie: Patientin wird durch Vollbäder, Sitzbäder und Scheidenirrigationen, sowie Abführkur vorbereitet und am 14. Juli 1884 operiert. Narkose, Steissrückenlage, Beinhalter. Zuerst wird das carcinomatöse Geschwür der hinteren Hälfte der rechten grossen Labie durch einen Ovalärschnitt, 2 cm entfernt vom Erkrankten umschnitten und im Gesunden exstirpiert; mehrere spritzende Arterien werden unterbunden, sonst Blutung gering. Vereinigung der Wundhöhle durch eine Menge transversaler Jodoformseidenknopfnähte zu einer sagittalen Linie; keine Drainage. Darauf Längsincision über den Mons Veneris in der alten Narbe. Dabei wird ein gut wallnussgrosser in der Tiefe gelegener Abscess mit carcinomatösen Wandungen und stinkenden Eiter enthaltend eröffnet. Ebenfalls Umschneidung der erkrankten Partie des Mons Veneris durch einen sagittalen Ovalärschnitt im Gesunden geführt. Vereinigung durch transversale Knopfnähte zu einer sagittalen Wundlinie, welche nach unten bis an die äussere Urethralmündung reicht. Die afficierten Inguinaldrüsen werden noch nicht in Angriff genommen.

Weiterer Verlauf.

14. Juli 1884. Nicht gebrochen, kein Fieber, keine Nachblutung. Wunde nicht geschwollen, nicht gerötet, in der Nachbarschaft und auf Druck nicht empfindlich; mehrere Male katheterisiert.
15. Juli. Kein Fieber, von heute ab spontan uriniert, sonst status idem.
19. Juli. Der Tampon heute aus der Vagina bei den Bewegungen im Bett herausgefallen; mit Wundsecret imbibierte, sonst aber geruchlos.
21. Juli. Sämtliche Nähte am Mons Veneris und aus der Vagina entfernt; alles primär geheilt, nur in der Vagina ist die hintere Hälfte der Wunde auseinander gewichen und heilt per secundam. Jodoform; nochmalige Tamponade.
22. Juli. Aufgestanden.
25. Juli. Zweite Operation. Rückenlage, Narkose, Exstirpation beider Leistendrüsenspakete, hauptsächlich stumpf; zun

Teil werden die Wunden, nachdem einige spritzende kleine Arterien unterbunden sind, durch die Naht vereinigt, der offen bleibende Teil wird mit einem Jodoformgazepfropf drainiert; fester Compressionsverband.

26. Juli. Keine Nachblutung, kein Fieber, Schmerzen in der Wundgegend.

28. Juli. Erster Verbandwechsel. Die Jodoformgaze stark durchblutet aber geruchlos, entfernt. Die Wundränder an beiden Leistenbeugen nicht entzündet; die Höhlen wenig secernirend, neue Ausstopfung derselben mit Jodoformgaze, fester Compressionsverband; die per secundam heilende Stelle im Verlaufe der Narbe am Mons Veneris wird täglich mit Campherwein und Watte ausgestopft und granuliert infolgedessen sehr gut.

2. August. Zweiter Verbandwechsel. Gute Granulation der Wunden in den Inguinalgegenden. Nähte entfernt. Vin. camphor.

6. August. Dritter Verbandwechsel. Wunde am Mons Veneris geschlossen, ebenso die linke Inguinalwunde. Vin. camphor.

12. August. Entlassung.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung:
12. August 1884. Linke Inguinalwunde ganz geschlossen, ebenso diejenige am Mons Veneris; die letztere etwas geschwollen, weich, kein Recidiv zu fühlen; rechte Leistenwunde gut granulierend, seicht und von gutem Aussehen; arg. nitr. Salbe darauf.

Am Introitus, an der rechten grossen Labie die Wunde vollkommen vernarbt, der Befund per vaginam derselbe wie bei der Aufnahme.

IX. Emma H. 22 Jahr. Aus Breslau. 5. Mai — 23. Juni 1885.
Übersicht: Carcinoma der linken Vulva. Infiltration der beiderseitigen Inguinaldrüsen. Exstirpation. Secundäre Heilung. Campherweincompressen.

Menstruation regelmässig alle 4 Wochen, mittelstark, 3 Tage lang, cessiert seit 6 Monaten.

Frühere Krankheiten. Oft leidend gewesen.

Jetzige Krankheit. Seit 6 Monaten bemerkte Patientin eine Geschwulst in der Schosse, die viel Schmerzen verursacht. Sie gebrauchte verschiedene Salben. Schmerzen links im Unterleib,

oft auch Kreuzschmerzen. Wasserlassen schmerzhaft. Stuhl regelmässig. Grosse Schwäche. Arbeitsunfähigkeit.

Jetzige Beschwerden. Schmerzen und Geschwollensein im Schoss. Grosse Schwäche aus Blutarmut.

Äussere Untersuchung. Mittelgrosses, graciles schlecht genährtes Mädchen. Sehr grosse Anäme. Die linke Vulva stark hypertrophiert, bräunlich gefärbt, hart ohne Infiltration. Auf der Innenfläche dieser Geschwulst ein halbmondförmiges hökriges granulierendes Geschwür. Die Ränder sind dick und scharf abgegrenzt. Die Vagina ist noch nicht von der Geschwulst ergriffen, dagegen hat die Neubildung bereits die Clitoris erreicht. Die Inguinaldrüsen stark vergrössert, links bedeutend mehr wie rechts.

Innere und kombinierte Untersuchung nicht vorgenommen wegen Virginitas.

Diagnose: *Carcinoma vulvae sinistrae*.

Microscopischer Befund. Verhorntes Carcinom.

Therapie. Exstirpation der Geschwulst, wobei weit in Gesunden geschnitten, und die Clitoris mit entfernt wird. Vereinigung der Wundränder durch zahlreiche Nähte, Entfernung der beiderseitigen Inguinaldrüsen. Rechts wird die Wunde ganz geschlossen, links dagegen die Wunde, da mehrere Gefässe unterbunden worden waren und die Höhle etwas tief hinein sich erstreckt, mit Jodoformgaze tamponiert. Verband um den Leib.

Weiterer Verlauf:

- 9. Mai. Kein Brechen. Katheterisation.
- 10. Mai. Wohlbefinden. Wunde der Vulva mit frischer Jodoformgaze belegt. Opium.
- 16. Mai. Verbandwechsel. Nähte entfernt. Keine primäre Heilung. Campherweincompressen sechsmal täglich gewechselt.
- 18. Mai. Gute Granulationen.
- 23. Mai. Geheilt entlassen.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung. Keine Schmerzen. Die Vulvawunde gut geheilt; man sieht eine feine Narbe, die von oben nach unten verläuft. Ebenso rechts die Inguinalwunde geheilt. Links geheilt bis auf einen 3—4 cm langen Streifen. Sitzbäder.

Die nun zu betrachtenden Neubildungen sind alle mit geringer Ausnahme ziemlich seltene pathologische Erscheinungen an der Vulva.

So das *Sarcom*, mit dem wir diese Reihe der Geschwülste beginnen wollen. Als typisches *Sarcom* scheint es nicht beobachtet worden zu sein, sondern es wird meist als *Fibrosarcom* beschrieben. Dasselbe entwickelt sich in dem Bindegewebe aller oder einzelner Abschnitte der Vulva und kann bedeutende Grösse erreichen, namentlich wenn es in den grossen Labien sitzt; dann hebt es durch seine Schwere dieselben herab, so dass dann bis die Knie herabhängende Tumoren entstehen können.

Eine seltenere Ursprungsstelle scheint die Schleimhaut der Urethra ext. zu sein. Um eine solche handelte es sich bei unserer Patientin, deren Krankengeschichte ich jetzt folgen lassen will. Nebenbei war es hier ein Recidiv, das ja bei den sarcomatösen Tumoren ebenfalls häufig ist.

X. Johanne K., geb. St. 61 Jahr. Aus Schottwitz, Kr. Breslau. 12. Sept. bis 26. Sept. 1884. Verheiratet seit 41 Jahren. Entbindungen, spontan, zuletzt vor 16 Jahren. Wochenbetten 4. Aborte: drei, im zweiten und vierten Monat, zuletzt vor 10 Jahren.

Frühere Krankheiten: Vor 30 Jahren Typhus überstanden.

Bisherige Therapie: Am 5. März 1884 in hiesiger Klinik (Prechthunden-Journal) operiert. Abtragung eines kleinen Gewächses an der unteren Harnröhrenwand.

Menstruation: Zum ersten Mal mit 16 Jahren, darauf regelmässig alle 4 Wochen, mittelstark, von 2—4 tägiger Dauer, ohne Schmerzen, Menopause seit 11 Jahren.

Übersicht: Ovalärer Schnitt um den Tumor und Exstirpation desselben, Vereinigung der Wunde, Vereinigung der Urethralstiche der Vaginalschleimhaut. Heilung in der Tiefe.

Jetzige Krankheit: Seit 1½ Jahren litt Patientin an sehr starkem citrigen Ausfluss, der periodisch von 1—2 Wochen lang haltenden Blutungen aus der Scheide begleitet war. Schmerzen waren nicht vorhanden; infolge dieser Beschwerden suchte Patientin die Hülfe der Klinik nach und wurde hier das Gewächs entfernt; Patientin war daher bis vor 6 Wochen frei von Beschwerden, seit dieser Zeit jedoch klagte sie über heftige Schmerzen beim Urinieren, über Blutungen und jauchenden Ausfluss, weshalb sie mit dem Finger wiederum das Wachstum der Geschwulst constatieren.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien:

Jauchiger, mit Fetzen und zersetzten Blutgerinnseln untermischter Ausfluss; periodisch Blutungen aus der Scheide. Von Seit des übrigen Körpers: Heftige Schmerzen beim Wasserlassen.

Objektiver Befund. Äussere Untersuchung: Mittelgroßhagere, sonst aber gut aussehende Person; Brustorgane gestaute Mammae schlaff hängend, atrophisch. Leib flach, eindrückbar, nichts in Abdomine zu fühlen. Oberflächliche Inguinaldrüsen entzündet, aber nicht schmerzhaft und verschieblich. Beim Auseinanderklappen der grossen Labien trifft man an der rechten Seite der nach dem Scheideneingang hin verlagerten äusseren Urethralmündung auf einen haselnussgrossen, von der Urethral-schleimhaut ausgehenden, kugligen, ziemlich breit aufsitzenden, aber verschieblichen Tumor, mit exulcerierter Oberfläche, grünlich und gelblich verfärbt ist.

Innere und kombinierte Untersuchung: Erweist neben einer senilen Involution die Genitalien als vollkommen normal und frei von ähnlichen Tumoren.

Diagnose: *Sarcoma orificii urethrae externi recidivum*.

Therapie: Patientin wird durch Sitzbäder, Scheidenirrigationen und Abführkur vorbereitet und am 17. September 1890 operiert. Steissrückenlage, Beinhalter, Narkose. Freilegung der Scheide mit Fritsch'schem Speculum und Simon'schen Seitenheber. Einführung eines männlichen Katheters. Umschneidung des Tumors im Gesunden in Form einer Ellipse und Abtragung derselben. Blutung mässig. Vereinigung der Wundfläche oben und unten durch transversale Nähte in sagittaler Richtung. Die in der Mitte gebliebene Wunde wird umsäumt im Kreise herum, sodass Scheidenschleimhaut an Urethral-schleimhaut zu liegen kommt. Drainage der Blase mit Gummiröhrchen; Tamponade der Scheide mit Jodoformgaze.

Weiterer Verlauf:

17. Sept. Keine Schmerzen, kein Erbrechen. Der Urin läuft durch das Röhrchen gut ab.
18. Sept. Leib auf Druck schmerzhaft. Urin läuft ab. Tinctura opii 10 Tropfen.
20. Sept. Das in die Urethra eingelegte Röhrchen ist herausgefallen. Patientin lässt den Urin spontan und ohne Schmerzen abfließen. Patientin klagt nachmittags über Schmerzen im Rücken und in der Brust, ohne dass etwas Pathologisches nachweisbar wäre. Morphium 0,01.

Sept. Keine Schmerzen.

Sept. Wohlbefinden. Entfernung des Scheidentampons. Abpflügung der Wunde. Jodoform.

Sept. Entfernung der Nähte. Heilung in der Tiefe. Mässige Eiterung.

Beschwerden u. Befund bei der Entlassung 26. Sept. Wunde ist nur in der Tiefe geheilt. Die Oberfläche etwas flüchtig und secerniert wenig Eiter. Der Kranken wird eine g. nitr. Salbe eingegeben und sie wird entlassen.

Wohl die seltensten Vulvartumoren bilden die *Neurome* und *enchondrome*.

Als *Enchondrome* werden in der Litteratur Fälle angeführt, es sich um „hornartige Geschwülste der Clitoris“ handelt. Ist in Hildebrandt's schon erwähntem „Buch der Krankheiten der äusseren weiblichen Genitalien“ ein von Schneevogt geteilter Fall citiert. Derselbe beschrieb als *Enchondroma Clitoridis* eine faustgrosse Geschwulst, die mit der Clitoris durch einen längeren Stiel verbunden war, eine höckerige Oberfläche hatte und in seinen Schnittflächen knorpelige Textur zeigte.

Ein *Neuroma Vulvae* hat Simpson beobachtet, der unter diesem Namen kleine Knötchen beschrieb, welche in dem orific. theae extern. sassen und sich durch grosse Schmerzhaftigkeit auszeichneten.

Als Formen epidermoidaler Neubildungen müssen hier angeführt werden das *Atherom* und das echte *Dermoid*.

Was das *Atherom* anlangt, so ist dasselbe eine Balggeschwulst mit meist breiigem Inhalt und einer höckerigen Innenfläche, deren Balg zum Unterschiede der später noch zu schildernden *Vulva-Vaginalcysten* eine weissliche Farbe hat (Epitheltag nach Klebs). Veranlassung zu derartigen Bildungen geben die Verstopfungen der in den grossen und kleinen Labien zahlreich sich vorfindenden Talgdrüsen. Manche Autoren, so Bärensprung, unterscheiden noch im Besonderen specifisch verschiedene Arten von *Atherome*, je nach dem Inhalt, Epithel und ihrer Gestaltung.

Das echte *Dermoid* oder auch *Dermoidcyste* genannt, ist schon längst hier bekannt und wurde namentlich von den französischen gynaecologen Hugier, Bois de Loury genauer studiert. Berichtet hat es später Rokitansky. Die Dermoidgeschwülste

haben Wandungen, die aus einer Einstülpung embryonaler Zellen der Cutis entstanden, aus cutanem Gewebe, Talgdrüsen, Haarbälgen bestehen und an der Innenfläche mit Pflasterepithel ausgekleidet sind. Ihren Inhalt bilden die Elemente der Hautpapillen und Talgdrüsen, bisweilen sind auch Haare, Zähne, auch Knochen in ihnen gefunden worden.

Den *Dermoidcysten* schliessen wir nun die eigentlichen *Vulvovaginalcysten* an. Darunter verstehen wir nach Auffassung älterer Autoren Geschwülste an der Vulva, die in einem allseitig geschlossenen Hohlraum einen mehr oder weniger flüssigen Inhalt bergen, der mit der Wand nicht zusammenhängt.

Wir haben hier aber zu unterscheiden einmal Cysten, deren Entstehungsursache in einer Erkrankung der Bartholinischen Drüsen zu suchen ist und zweitens Cysten, die aus anderen Gebilden der Vulva sich gebildet haben.

Cysten an den Bartholinischen Drüsen kommen teilweise dadurch zustande, dass der Ausführungsgang der Bartholinischen Drüse sich erweitert: Dilatationescysten, die meist glattwandige Höhlen mit fadenziehendem Inhalt bilden, teilweise dadurch, dass die Secretionsgänge sich verstopfen. Dann sammelt sich in der hinter der Verstopfung gelegenen Drüsengängen Secret an, so dass sich ein oder mehrere Hohlräume bilden, welche sich unter Umständen sogar nach der Scheide zu öffnen können (v. Recklinghausen¹).

Nun kommen auch Cysten vor, die mit den oben erwähnten Bartholinischen Schleimdrüsen gar nichts gemein haben. Diese Kategorie von Tumoren kann sehr verschiedenen Ursprung haben. So können durch Dilatation abgeschnürter Stücke des Canalis Nucki Cysten sich entwickeln, sogenannte *Peritonealcysten* (Ziegler). Dann bilden sich leicht aus den zahlreichen Talg- und Schleimdrüsen Retentionescysten und aus Lymphgefäßeectasien Lymphcysten. Auch als Folge von Blutergüssen kommen durch Abkapselung derselben und Resorption des Blutes nach dem Vorangehen der Bildung von apoplectischen Cysten mit Serum gefüllte Cysten vor.

Infolge der Entstehung dieser Gebilde aus so verschiedene

¹) v. Recklinghausen, Cysten der Bartholinischen Drüsen. Virchow Archiv. 84. Band.

elementen der Vulva ist es sehr natürlich, dass diese Hohlräume grosse Abwechselung in Bezug auf Grösse und Form sowohl, als auch auf Inhalt und Structur ihrer Wandungen darbieten werden.

Die kleinsten Tumoren bilden in der Regel die aus den Talg- und Schleimdrüsen entstandenen Cysten. Meist erbsen- bis kirscherngross liegen sie dicht unter der Schleimhaut an der Innenseite der Nymphen, haben dünne structurlose Wandungen und enthalten, zahlreiche Fettmoleküle führenden Inhalt.

Grösser sind die von Busch und Klob beschriebenen aus Lymphgefässectasien hervorgegangenen Bildungen. Die grössten Formen bilden jedoch in der Regel die zu Cysten entarteten Bartholinischen Drüsen.

Sie sitzen genau an der Stelle der Drüsen, können sehr gross werden, — in einem der unseren beiden weiter unten mitzutheilenden Fälle haben wir es mit einem beinahe gänseeigrossen Tumor zu thun — ihre Wandung ist ziemlich fest, nach innen mit Plattenepithel bekleidet, nach aussen mit dem benachbarten Zellengewebe verwachsen, so dass eine Ausschälung derselben sehr schwierig sein dürfte.

Der Inhalt ist auch verschieden. Entweder wird er bei gesteigerter Transsudation aus dem Blute dünnflüssiger, serös, oder wenn die Drüsensecretion sehr praevaliert, sehr fadenziehend und schleimig sein. Ist die Wandung der Cyste mit zahlreichen Gefässen durchsetzt, so können haemorrhagische Ergüsse sich hinzugesellen und der Inhalt wird dann braunrot, später schwärzlich, chokoladenähnlich. Tritt ein entzündlicher Prozess hinzu, so finden wir in der Flüssigkeit Eiterkörper und dann haben wir es mit Abscesscysten zu thun (Ign. Opieliński¹⁾).

Von diesen *Vulva-Vaginalcysten* kann ich über 2 Fälle aus unserer Klinik berichten.

XI. Helene M. geb. B.; 55 Jahr, aus Breslau. 26. November 1883. 17. December 1883.

Diagnose: *Cysta vulvo-vaginalis*.

Übersicht: Gänseeigrosse Vulvo-vaginalcyste mit vorwiegend der Entwicklung im rechten Labium majus. Exstirpation des Tumorsacks. Fieberloser Verlauf. Heilung.

¹⁾ Ign. Opieliński, Inaug.-Dissertat. Über die Cystengeschwülste der Vulva. Breslau 1876.

Verheiratet 17 Jahre lang. Zwei Entbindungen, beide spontan. Wochenbetten normal. Letzte vor 30 Jahren.

Menstruation. Zuerst mit 15 Jahren. Von da an regelmässig alle 4 Wochen, sehr stark, schmerzlos, von 3—4 tägiger Dauer. Cessiert seit 3 Jahren.

Jetzige Krankheit. Nach der letzten Geburt vor 30 Jahren bemerkte Patientin eine taubeneigrosse Geschwulst der rechten Schamlippe, die ganz allmählich im Verlauf dieser Zeit an Grösse zunahm. Seit einem Jahre will Patientin etwas rascheres Wachstum bemerkt haben. Bei stärkerer Körperanstrengung schwellte die Geschwulst jedesmal etwas an. Schmerzen wurden nie empfunden. Das Allgemeinbefinden stets ein durchaus gutes, nur stellte sich in der letzten Zeit Ausfluss ein.

Jetzige Beschwerden von Seiten der Genitalien. Mässiger Ausfluss. Von Seiten der übrigen Körperteile keine Behinderung beim Gehen.

Objektiver Befund. Äussere Untersuchung. Grosse, robust gebaute, gesund aussehende, gut genährte Frau. Brustorgane gesund. Mammae gut entwickelt; hängend. Abdominalorgane gesund. Vor der Vulva liegt ein circa gänseeigrosser, birnförmiger von normaler Haut überzogener glatter Tumor, über dessen Vorderfläche eine hahnenkammartige Hautfalte (rechte kleine Schamlippe) bis in die Mitte seiner Höhe verläuft. Oben rechts geht die Haut des Mons Veneris unverändert auf den Tumor über. An seiner dem linken Schenkel zugewandten Seite ist er mit vor die Vulva gezogener Scheidenschleimhaut bekleidet. Rechte grosse Schamlippe ist in die die Geschwulst überziehende Haut aufgegangen, linke läuft über die dem linken Schenkel zugewandte Seite weg und verliert sich im Frenulum. Die linke kleine Schamlippe liegt als zackiger in die Länge gezogener Hautlappen der linken Seite des Tumor auf. Beide kleinen Schamlippen treffen sich an normaler Stelle an der etwas vergrösserten Clitoris. Die Palpation des Tumor ergibt, dass derselbe aus Abteilungen besteht, die eine vor, die andere in der Vagina gelegen, beide durch eine seichte Einschnürung getrennt. Die Consistenz ist eine prall elastische Fluctuation. Keine Druckempfindlichkeit. Reposition unmöglich. Absolut gedämpfter Percussionsschall.

Innere und kombinierte Untersuchung. Scheidenei-

gang ziemlich weit, Scheide rechts in ihren Linien beengt durch einen halb kugeligen, prall elastischen, hühnereigrossen in der rechten Vaginalwand sitzenden Tumor. Portio klein, oben querspaltförmig, man fühlt und sieht im speculum aus demselben einen erbsengrossen Schleimpolypen hervorragen. Corpus uteri nicht vergrössert; normale Lage.

Diagnose: *Cysta vulvo-vaginalis*.

Mikroskopischer Befund. Von der inneren Cystenwand abgekratztes Epithel zeigt sich zusammengesetzt aus sehr schlanken keilförmigen Zellen, deren dem Lumen der Cyste zugewandtes Ende von einem stark lichtbrechenden Saume begrenzt wird, welchem schön ausgebildete Cilien aufsitzen.

Therapie. Den 30. November 1883 Operation. Narkose. Beinhalter. Hautschnitt an der Vorderfläche der Geschwulst; die dünne Haut alsdann nach beiden Seiten zurückpräpariert, um den Cystensack womöglich uneröffnet herauszuschälen. Nachdem jedoch die dünne Wandung der Cyste an einer Stelle verletzt worden ist, wird dieselbe breit incidiert und eine kleine Tasse sehr dickflüssigen chokoladbraunen, ins olivgrüne spielenden Inhalts entleert, der Cystensack ausgespült und vollends excidiert. Ein Teil der denselben bedeckenden Haut reseziert, wobei die rechte kleine Schamlippe mit entfernt wird und nach reichlicher Irrigation der Wundfläche und Unterbindung von 8—10 spritzenden Arterien der linksseitige Hautlappen mit zahlreichen Knopfnähten an dem rechtsseitigen angenäht. Bepulverung mit Jodoform und Jodoformgazeläppchen vor die Vulva. Es wird zur Irrigation zum ersten Mal Sublimat angewandt.

Weiterer Verlauf.

30. November 1883. (Siehe Operation.) Abends gutes Befinden, geringe Schmerzen im Schoss.

1. Dezember. Klagen der übrigens unintelligenten Patientin über Brennen im Schoss und Schneiden im Unterleibe. Vor die Operationsstelle wird täglich ein neuer trockener Jodoformgazetampon gelegt. Die Wundlinie und der Introitus mit Jodoform bestäubt.

2. Dezember. Bis auf geringe Schmerzen im Unterleib andauernd gutes Befinden.

3. Dezember. Entfernung der Nähte, die zum geringen Teil schon die mässig geschwollenen Wundränder durchschnitten

haben. Die letzteren liegen nach vorn hin gegen den Mons Veneris genau aneinander; weiter hinten in der Vagina geringere Klaffen derselben. Nirgends Eiterung. Ausspülung der Vagina mit Sublimat. Bepulverung der Wundlinie mit Jodoform.

17. Dezember. Entlassen.

Beschwerden und Befund bei der Entlassung. In der rechten Seite der Vagina und von ihr auf die mediane Fläche der rechten grossen Schamlippe verlaufend und in einem spitz ausgezogenen Hautlappen desselben endigend, befindet sich eine circa 8 cm lange vor der Vulva liniäre, in die Vagina halbfingerbreit klaffende, von unregelmässigen, etwas infiltrierten Rändern eingefasste Wundlinie, die geringes eitriges Secret liefert. Patientin ist im Stande, ohne Schmerzen und sonstige Beschwerden zu gehen und sich zu bewegen.

XII. Emilie F. geb. H. 56 Jahr.

Siebenmal geboren. Letzte Geburt vor 12 Jahren. Wochenbett fieberfrei. Dreimal abortiert im 2. bis 3. Monat. Keine Blutungen dabei. Letzter Abort angeblich vor 15 Jahren. Periode regelmässig alle 4 Wochen, stark, von achttägiger Dauer, ohne Schmerzen. Menopause seit 5 Jahren.

Stets gesund gewesen. Seit 17 Jahren bemerkt Patientin an dem linken Hinterbacken (am Vulvarrand) in der Gegend der hinteren Vulvarcommissur eine kleine Geschwulst von Taubeneigrösse, die sich ohne Schmerzen bis auf Faustgrösse ansdehnte. Eine Entzündung an der Stelle ist von der Patientin nie bemerkt worden. Stuhl und Urinsecretion normal.

Status praesens. Mittलगrosse Person, von mittlerem Ernährungszustande und etwas blasser Hautfarbe. Herz und Lunge gesund. Dicht neben der Mittellinie links von derselben zwischen hinterer Vulvarcommissur und Ani eine Gänseeigrosse schmerzlose beweglich auf ihrer Unterlage sitzende Geschwulst von weicher lipomatöser Consistenz, besonders in ihren unteren Abschnitten. Haut darüber nicht gerötet, nicht verschieblich. Von der Vagina und dem Rectum aus nichts von der Geschwulst zu palpieren.

Explorat. per vaginam weist normale Verhältnisse nach.

Therapie. Täglich dreimal Sitzbäder, Bettruhe, Carbolumschläge auf das Peritoneum, Abführkur.

Operation. Chloroformnarcose. Rückensteisslage. Bein-

alter. Sagittalschnitt durch die Haut bis auf die Tumorwand über der höchsten Erhebung der Geschwulst. Darauf Trennung der Haut von der Geschwulstwand theils mit dem Messer, theils mit der Scheere, wobei jedoch der Tumor angeschnitten wird und eine grosse Menge breiiger mit weissen Plättchen untermischten Inhaltes entleert wird, worauf die Cystenwand sich mit Leichtigkeit entfernen lässt. Geringe Blutung. Vereinigung der Wundränder durch 20 theils tiefe, theils oberflächliche Suturen, wodurch ein geringes Ectropium der linken grossen Labie bedingt wird. Die Wundhöhle mit Jodoform bepulvert. Jodoformgaze. Heftpflasterverband.

4. Dezember. Kein Fieber. Verbandwechsel. Wundränder nicht geschwollen. Ihre Umgebung geröthet, nicht schmerzhaft. Gaze etwas durchblutet. In der Mitte der Wunde ein Blutgerinnsel. Jodoformgaze. Heftpflaster. 30 Tropfen Tinct. thebaica.

5. Dezember. Verbandwechsel. Die Gaze immer noch etwas durchblutet. Keine Schmerzen, Schwellung und Rötung. Kein Fieber. Aus der Scheide hat sich ein geringer schleimiger Abfluss wegen Ectasie der linken grossen Labie eingestellt.

8. Dezember. Sämmtliche Nähte entfernt. Die Wunde per primam intentionem geheilt. Keine Schmerzen und Rötung. Kein Verband.

9. Dezember. Entlassung. Wunde primär geheilt. Hintere Hälfte der linken grossen Labie ectropioniert. Schleimiger geringer Ausfluss aus der Vagina. Befund per vaginam ohne Interesse. Patientin fieberfrei, hat beim Laufen weder Schmerzen noch Spannung im Perineum, beim Sitzen ebenfalls nicht.

Endlich wäre noch der von den Gefässen ausgehenden geschwulstartigen Bildungen der Vulva zu gedenken.

Es können zunächst ausgedehnte *varicöse* Veränderungen der Venen an den äusseren Genitalien leicht Veranlassung zu grossen Geschwulstbildungen geben, namentlich zur Zeit der Schwangerschaft. Es sind Fälle in der Litteratur erwähnt, wo bei Schwangeren aus solchen Varicen sich kindskopfgrosse Tumoren entwickelten, die infolge der grossen Gefahr der Blutung durch Aufbrechen und Ulceriren des Tumors eine sehr gefährliche Geburtscomplication werden können. Ihre anatomische Beschaffenheit ergibt sich leicht aus der Natur ihrer Entstehung.

Ausser Varicen können auch angeborene Teleangiectasien dadurch, dass sie sich zur Zeit der Pubertät vergrössern, beträchtliche Geschwülste veranlassen (Fritsch).

Wohl zu unterscheiden sind aber von diesen Bildungen die eigentlichen Blutgeschwülste, Haematome oder Thromben genannt. Sie sind, abgesehen von der Geburt, nach Schroeder ausschliesslich traumatischen Ursprungs. Hat nämlich infolge irgend eines Traumas eine Ruptur von Gefässen stattgefunden, und sich das Blut aus den Gefässwandungen in das unverletzt gebliebene Unterhautbindegewebe ergossen, so drängt dann dieser Erguss die unverletzte Decke tumorenartig empor, so dass sich dem Beobachter eine prall sich anfühlende Geschwulst präsentiert. Für die Bildung solcher Haematome bieten namentlich die umfangreichen Venenplexus der Clitoris und der Corpora cavernosa mit ihren zahlreichen dünnwandigen Gefässen einen günstigen Boden. Denn es bedarf hier nur eines unbedeutenden Eingriffes, um eine Zerreissung von Gefässen und eine spätere Blutung hervorzurufen. Auch hier sind es namentlich Wöchnerinnen und Kreissende, die zu derartigen Bildungen disponieren. Ausserhalb der Schwangerschaft sind derartige Bildungen seltener und auch nie von solcher beträchtlicher Grösse beobachtet worden.

Lebenslauf.

Verfasser, katholisch, geb. den 11. Dezember 1860 zu Klein-Valtersdorf, Kr. Bolkenhain, Sohn des Königl. Oberamtmanns und Domänenpächters Paul Mertz, besuchte das Gymnasium zu Schweidnitz und das königl. kath. Matthiasgymnasium zu Breslau. Ostern 1881 verliess er das letztere mit dem Zeugnis der Reife und widmete sich an der Universität zu Breslau dem Studium der Medicin. Am 22. Juni 1883 bestand er das tentamen physicum. Während des Sommersemesters 1884 studierte er in Freiburg i. B. und vom Oktober 1884 ab wieder in Breslau. Am 11. Mai 1885 legte er das Examen rigorosum ab. Während seiner Studien besuchte er die Vorlesungen und Kliniken folgender Herren Professoren und Docenten:

Bäumler, Berger, Biermer, F. Cohn, Engersser, Fischer, Förster, Fritsch, Haeser, Hasse, Hegar, Heidenhain, Hirt, Joseph, Kolaczek, Kraske, Kroner, Löwig, Maier, Meyer, Neisser, Partsch, Poleck, Ponfick, Richter, Sommerbrodt, Strasser, Soltmann, Thomas, Unverricht, Wiedow.

Allen diesen seinen hochverehrten Herren Lehrern spricht Verfasser hiermit öffentlich seinen aufrichtigen Dank aus.

Thesen.

I.

Die spitzen Condylome der Frauen sind stets auf gonorrhoeische Infection zurückzuführen.

II.

Die Sprengung der Blase ist die sicherste Methode zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt.

III.

Die Magenausspülung ist bei Ileuserscheinungen stets zu versuchen.
